

แครอท



แครอท เป็นพืชกินหัวที่มีปลูกมากในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง และรู้จักกันมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นอาหารหลักที่นิยม เป็นพืชกินหัวที่ใช้ต้นทุนในการผลิตและแรงงานต่ำ แครอทสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทำสลัด ส้มตำ ต้มจืด ผัดกับเนื้อสัตว์ หรือตกแต่งอาหารหรือขนมให้สวยงาม

พันธุ์ ที่นิยมปลูก ได้แก่ หงษ์แดง, New kuruda, Inperater, Nantes

สภาพแวดล้อม

พื้นที่ปลูกควรอยู่ในพื้นที่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๖๐๐-๑,๓๐๐ เมตร ต้องการน้ำในการเจริญเติบโต ในช่วงแรกสูง ชอบดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ การให้ปุ๋ยคอกแก่แครอท ไม่ควรให้ปุ๋ยคอกที่ยังสด

การปลูกและการดูแลรักษา

การเตรียมกล้า ขุดดินตากไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำร่องหยอดเมล็ดลึก ๑ เซนติเมตร ห่างกัน ๑๐ เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดห่างกัน ๑ ซม. เอาดินกลบ รดน้ำพอชุ่ม

การปลูก ถอนแยกต้นกล้า เมื่ออายุประมาณ ๑๕-๒๐ วัน หรือมีใบจริง ๓-๕ ใบ ถอนแยกครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๑ เดือน โดยใช้ระยะปลูก ๘๖x๑๕ ซม. ให้ปุ๋ยสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ หรือ ๑๒-๑๒-๒๗ ในอัตรา ๕๐-๑๐๐ กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การเก็บเกี่ยว

เมื่อแครอทอายุได้ประมาณ ๘๐-๑๐๐ วันขนาดของหัวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว แต่ต้องไม่ใหญ่เกินไป ตัดแต่งใบ ทำความสะอาดหัวล้างให้แห้ง ก่อนทำการบรรจุในภาชนะ ระวังไม่ให้หัวบอบช้ำ ขณะเก็บเกี่ยวและขนส่ง ผลผลิต ประมาณ ๒,๘๘๐ กิโลกรัม/ไร่